



CENTRE EL MOUMEN

Cours détaillé

**Suivi temporel d'une
transformation - Vitesse de
réaction**

Niveau : Deuxième Bac
sciences PC /SVT

Plan de chapitre 5 : Suivi temporel d'une transformation - Vitesse de réaction

- **Cours détaillé**
- **Résumé de cours**
- **Série d'exercices**
- **Correction détaillée des exercices**

2^{ème} BAC
Prof El Moumen
المومن جا عندك
حتى الدار

Collection CAM – Compte Personnel

   Prof El Moumen  06 66 73 83 49  Prof El Moumen

Collection CAM – Compte Professionnel

   Centre El Moumen <https://www.elmoumen.academy>

I – Suivi temporel de la transformation chimique :

La **cinétique chimique** vise à **suivre l'évolution** de la transformation chimique, en particulier à **déterminer l'avancement** $x = f(t)$.

A cette fin, des **méthodes physiques** et **chimiques** sont adoptées :

Les méthodes physiques sont utilisées lorsque certaines **grandeurs physiques mesurables** dans un **milieu réactionnel** sont liées à la **concentration** de certaines des **espèces chimiques** présentes dans ce milieu, notamment : **Conductimétrie** - **pH-métrie** - **mesure de volume ou de pression** - **Spectrophotométrie**. Ces méthodes se caractérisent par un **enregistrement continu** de l'**évolution** de la **quantité de matière** ou de la **concentration** dans le **temps**, et un **temps très court** et **non parasites** pour le **milieu réactionnel**.


Il existe des **méthodes chimiques** telles que l'**étalonnage**. Ces méthodes ne permettent pas d'**enregistrer en continu** l'**évolution** de la **quantité de matière** ou de la **concentration** d'un **réactif** ou d'un **produit** dans le **temps**.

II – Suivi de l'évolution temporelle d'une transformation chimique :

1– Suivi de l'évolution temporelle d'une transformation chimique par le dosage :

1-1- Étude cinétique de la réaction entre l'eau oxygénée et l'ion iodure :

On verse, dans un bécher, un volume de solution d'eau oxygénée $H_2O_{2(aq)}$ (incolore) de concentration $C = 0,20 \text{ mol.L}^{-1}$ et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, puis on ajoute un volume de solution d'iodure de potassium ($K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)}$) (incolore) de concentration $C' = 0,20 \text{ mol.L}^{-1}$.



Après **agitation**, on remarque que le **mélange** prend **progressivement** une **couleur jaune** (A), puis **marron** (B) pour devenir après **quelques minutes** plus **foncé** (C).

a- Quel est l'**espèce chimique** responsable de la **couleur observée** ?

La **couleur observée** caractérise $I_{2(aq)}$, et on explique l'**augmentation** de l'**intensité** de la **couleur** par l'**augmentation** de la **concentration** de $I_{2(aq)}$.

b- Déterminer les **couples oxydant/réducteur** intervenants dans **cette réaction**.

Les **deux couples** sont : $H_2O_{2(aq)} / H_2O_{(l)}$ et $I_{2(aq)} / I^-_{(aq)}$.

c- Écrire l'équation de **cette réaction**.

Pour le **premier couple** : $H_2O_{2(aq)} + 2 H^+_{(aq)} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 H_2O_{(l)}$

Pour le **deuxième couple** : $2 I^-_{(aq)} \rightleftharpoons I_{2(aq)} + 2 e^-$

L'équation bilan : $H_2O_{2(aq)} + 2 I^-_{(aq)} + 2 H^+_{(aq)} \rightarrow I_{2(aq)} + 2 H_2O_{(l)}$

d- Quel est l'**espèce chimique** dissoute peut être **dosée** ?

On peut **doser** $I_{2(aq)}$ à un **instant donné**.


1-2- Détermination de la quantité de matière de diiode à un moment donné :

On verse, dans un bécher, un volume $V = 100 \text{ ml}$ de solution d'iodure de potassium ($K_{(aq)}^+ + I_{(aq)}^-$) de concentration $C_1 = 0,400 \text{ mol.L}^{-1}$, puis on ajoute un volume $V = 100 \text{ ml}$ de solution de peroxydisulfate de potassium ($2K_{(aq)}^+ + S_2O_{8(aq)}^{2-}$) de concentration $C_2 = 0,036 \text{ mol.L}^{-1}$ acidifier par **1 ml** d'acide sulfurique concentré.

Immédiatement, en préparant le mélange, on prélève un volume $V' = 10 \text{ ml}$ du mélange réactionnel et on le verse dans un bécher à l'instant $t = 0$, et on ajoute dans ce bécher **50 ml** d'eau glacée (0°C) et quelques gouttes d'empois d'amidon.

On dose le diiode formé à l'instant t par la solution de thiosulfate de sodium ($2Na_{(aq)}^+ + S_2O_{3(aq)}^{2-}$) de concentration $C_3 = 0,020 \text{ mol.L}^{-1}$.

On refait les opérations précédentes à différents instants, comme l'indique le tableau suivant :



$t \text{ (min)}$	0	3	6	9	12	16	20	30	40	50	60
$n(I_2)_t \text{ mmol}$	0,0	0,5	1,0	1,4	1,7	2,1	2,3	2,8	3,1	3,2	3,3

a- Pourquoi on verse l'échantillon du mélange réactionnel dans l'eau glacée avant chaque dosage ?

Ce processus s'appelle la **plongée** dont leur but est d'**arrêter la réaction** par la **dilution** et le **refroidissement**.

b- Crée le **tableau d'avancement** de la réaction des ions peroxydisulfate et des ions iodure. On donne : $S_2O_{8(aq)}^{2-} / SO_{4(aq)}^{2-}$ et $I_{2(aq)} / I_{(aq)}^-$.

Pour le **premier couple** : $S_2O_{8(aq)}^{2-} + 2e^- \rightleftharpoons 2SO_{4(aq)}^{2-}$

Pour le **deuxième couple** : $2I_{(aq)}^- \rightleftharpoons I_{2(aq)} + 2e^-$

L'équation bilan : $2I_{(aq)}^- + S_2O_{8(aq)}^{2-} \rightarrow I_{2(aq)} + 2SO_{4(aq)}^{2-}$

L'équation de la réaction		$2I_{(aq)}^- + S_2O_{8(aq)}^{2-} \rightarrow I_{2(aq)} + 2SO_{4(aq)}^{2-}$			
L'état du système	L'avancement de la réaction	La quantité de matière en (mol)			
Etat initial	0	$n_1 = C_1 \cdot V$	$n_2 = C_2 \cdot V$	0	0
En cours	x	$C_1 \cdot V - 2 \cdot x$	$C_2 \cdot V - x$	x	$2 \cdot x$
Etat final	x_f	$C_1 \cdot V - 2 \cdot x_f$	$C_2 \cdot V - x_f$	x_f	$2 \cdot x_f$

c- Quelle est la **relation** entre la **quantité de matière de diiode formé** à l'instant t et l'**avancement** de la réaction x au même instant ?

À partir du **tableau d'avancement**, on trouve que $n(I_2)_t = x(t)$.

d- Comment **suivre l'évolution temporelle** de cette **transformation chimique** ?

Le **dosage de diiode** $I_{2(aq)}$ par les ions **peroxydisulfate** $S_2O_{8(aq)}^{2-}$ permet de **suivre l'évolution temporelle** de l'**avancement** de la réaction x , et calculant ainsi les

quantités de matière des autres constituants du milieu réactionnel à chaque instant t , tel que : $n(I_{(aq)}^-)_t = C_1 \cdot V - 2 \cdot x(t)$, $n(S_2O_8^{2-}(aq))_t = C_2 \cdot V - x(t)$ et $n(SO_4^{2-}(aq))_t = 2 \cdot x(t)$.

e- Crée le **tableau d'avancement** de la **réaction de dosage** entre les ions thiosulfate et le diiode. **On donne** : $S_4O_6^{2-}(aq) / S_2O_3^{2-}(aq)$ et $I_{2(aq)} / I_{(aq)}^-$.

Pour le **premier couple** : $2 S_2O_3^{2-}(aq) \rightleftharpoons S_4O_6^{2-}(aq) + 2 e^-$

Pour le **deuxième couple** : $I_{2(aq)} + 2 e^- \rightleftharpoons 2 I_{(aq)}^-$

L'équation bilan : $I_{2(aq)} + 2 S_2O_3^{2-}(aq) \rightarrow 2 I_{(aq)}^- + S_4O_6^{2-}(aq)$


L'équation de la réaction		$I_{2(aq)} + 2 S_2O_3^{2-}(aq) \rightarrow 2 I_{(aq)}^- + S_4O_6^{2-}(aq)$			
L'état du système	L'avancement de la réaction	La quantité de matière en (mol)			
Etat initial	0	$n'_p(I_{2(aq)})$	$n_3 = C_3 \cdot V_{eq}$	n_0	0
En cours	x	$n'_p(I_{2(aq)}) - x$	$C_3 \cdot V_{eq} - 2 \cdot x$	$n_0 + 2 \cdot x$	x
Etat final	x_{eq}	$n'_p(I_{2(aq)}) - x_{eq}$	$C_3 \cdot V_{eq} - 2 \cdot x_{eq}$	$n_0 + 2 \cdot x_{eq}$	x_{eq}

tel que n_0 est la **quantité de matière** de $I_{(aq)}^-$ contenue dans l'**échantillon titré**.

f- Exprime la **quantité de matière** de **diiode formé** $n'_p(I_{2(aq)})$ en fonction de **volume d'équivalence** V_{eq} et de la **concentration molaire** C_3 de la **solution** de **thiosulfate de sodium** .

À l'équivalence, on a $x_E = n'_p(I_2) = \frac{C_3 V_E}{2}$. Etant donné que le **volume** du **mélange réactionnel** est égale à **10 fois** le **volume** de l'**échantillon prélevé**, alors, la **quantité de matière** de **diiode formé** à un **instant donné** dans le **mélange réactionnel** est : $n_p(I_2) = 10 n'_p(I_2) = 5 C_3 V_E$.

g- Tracer la **courbe** $x = f(t)$.





1-3- Résumé :

Le **dosage** permet de **suivre l'évolution temporelle** de **l'avancement de la réaction** x , où x peut être calculé à chaque instant à partir de la connaissance de la **quantité de matière** de l'un des **réactifs** ou des **produits formés** à cet instant.

2- Suivi de l'évolution temporelle d'une transformation chimique par :

2-1- La mesure de pression d'un gaz :


On introduit, dans une fiole branché avec un manomètre, le volume $V = 50,0 \text{ mL}$ de solution de l'acide chlorhydrique de concentration $C = 0,5 \text{ mol.L}^{-1}$ et le ruban de magnésium de masse $m = 0,020 \text{ g}$.



On enregistre la valeur de la pression toutes les 30 secondes.

a- Écrire l'équation de cette réaction.

On considère les couples suivants :



L'équation bilan : $\text{Mg}_{(\text{s})} + 2 \text{H}^+_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})}$

b- Calculer les quantités de matière initiale des réactifs.

On a $n_i(\text{H}_3\text{O}^+) = C \cdot V = 0,5 \times 0,05 = 25 \text{ mmol}$

et $n_i(\text{Mg}) = \frac{m(\text{Mg})}{M(\text{Mg})} = \frac{0,020}{24,3} = 0,82 \text{ mmol}$

c- Déterminer le réactif limitant et la valeur de x_m .

Puisque on a $\frac{n_i(\text{H}_3\text{O}^+)}{2} > \frac{n_i(\text{Mg})}{1}$, alors le réactif limitant est $\text{Mg}_{(\text{s})}$ et l'avancement maximale est :

$$x_m = \frac{n_i(\text{Mg})}{1} = 0,82 \text{ mmol}$$

d- Crée le tableau d'avancement de cette réaction.

Le ruban de magnésium $\text{Mg}_{(\text{s})}$

$t \text{ (s)}$	$P \text{ (hPa)}$
0	1013
30	1025
60	1036
90	1048
120	1060
150	1068
180	1079
210	1081
240	1087
270	1091
300	1093
330	1093

L'équation de la réaction		$\text{Mg}_{(\text{s})} + 2 \text{H}^+_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})}$			
L'état du syst	L'avancement	La quantité de matière en (mmol)			
Etat initial	0	0,82	25	0	0
En cours	x	$0,82 - x$	$25 - 2 \cdot x$	x	x
Etat final	x_{max}	0	23,4	0,82	0,82

e- Cette réaction donne un gaz de dihydrogène, entraînant une augmentation de la pression à l'intérieure d'une fiole de volume constant. Le manomètre mesure la pression à l'intérieure de la fiole : $\mathcal{P} = \mathcal{P}_{\text{atm}} + \Delta\mathcal{P}$ où $\mathcal{P}_{\text{atm}}$ est la pression atmosphérique. Trouver la relation entre la variation de pression $\Delta\mathcal{P}$ du gaz à l'intérieur de la fiole et l'avancement de la réaction x (on considère que le gaz est parfait).

↳ À l'état initial, on a $\mathcal{P}_{\text{atm}} = n_0 \cdot \frac{R.T}{V}$ où n_0 est la quantité de matière des espèces situées dans l'air.

↳ au cours de la transformation :

$$\mathcal{P} = (n_0 + n(\text{H}_2)) \cdot \frac{R.T}{V} = n_0 \cdot \frac{R.T}{V} + n(\text{H}_2) \cdot \frac{R.T}{V} = \mathcal{P}_{\text{atm}} + n(\text{H}_2) \cdot \frac{R.T}{V}$$

et puisque : $n(\text{H}_2) = x(t)$ alors : $\Delta\mathcal{P} = n(\text{H}_2) \cdot \frac{R.T}{V} = x(t) \cdot \frac{R.T}{V}$ (1)

↳ À l'état final, on a : $\Delta\mathcal{P}_{\text{max}} = x_{\text{max}} \cdot \frac{R.T}{V}$ (2)

de (1) et (2) on déduit que : $\frac{(1)}{(2)} \quad \frac{\Delta\mathcal{P}}{\Delta\mathcal{P}_{\text{max}}} = \frac{x(t) \cdot \frac{R.T}{V}}{x_{\text{max}} \cdot \frac{R.T}{V}} = \frac{x(t)}{x_{\text{max}}}$


alors : $x(t) = x_{\text{max}} \cdot \frac{\Delta\mathcal{P}}{\Delta\mathcal{P}_{\text{max}}}$ avec $x_m = 0,82 \text{ mmol}$, $\mathcal{P}_{\text{atm}} = 1013 \text{ hPa}$ et

$$\Delta\mathcal{P}_{\text{max}} = \mathcal{P} - \mathcal{P}_{\text{atm}} = 80 \text{ hPa}$$

f- Calculer $x(t)$ à différents instants.

Voir ci-contre.

g- Tracer la courbe $x = f(t)$.



t (s)	x (mmol)
0	0
30	0,12
60	0,24
90	0,36
120	0,48
150	0,56
180	0,64
210	0,70
240	0,76
270	0,80
300	0,82
330	0,82

Exemple :

On a $\Delta P = 1068 - 1013 = 55 \text{ hPa}$, donc $x(150) = 0,82 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{55}{80} = 0,56 \text{ mmol}$

alors $n_{150}(H_2) = n_{150}(Mg^{2+}) = 0,56 \text{ mmol}$

et $n_{150}(H^+) = (25 - 2 \times 0,56) \cdot 10^{-3} = 23,88 \text{ mmol}$

et $n_{150}(Mg) = (0,82 - 0,56) \cdot 10^{-3} = 0,26 \text{ mmol}$

Résumé :

La mesure de pression du gaz permet de suivre l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction x d'une manière continue.

2-2- La conductimétrie :

On verse, dans un bécher, 50 ml d'eau distillée et 25 ml d'alcool, et on met le bécher dans un bain Marie à température de 20°C. Puis on ajoute, dans ce bécher, 1 ml de 2-chloro-2-méthylpropane ($n_0 = 9,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$) et noté RCl. On fait l'étalonnage de la conductimètre et on immerge la cellule de mesure dans le mélange après l'agitation. Après chaque 200 secondes, on enregistre la conductivité $\sigma(t)$ de la solution comme l'indique le tableau ci-dessous :

$t(s)$	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
σ (S/m)	0	0,489	0,977	1,270	1,466	1,661	1,759	1,856	1,905	1,955	1,955

a- Écrire l'équation de cette réaction.

L'équation bilan : $RCl + H_2O_{(l)} \rightarrow ROH + H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

b- Crée le tableau d'avancement de cette réaction.

L'équation de la réaction		$RCl + H_2O_{(l)} \rightarrow ROH + H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$					
L'état du système	L'avancement de la réaction	La quantité de matière en (mmol)					
Etat initial	0	n_0	en excès	0	0	0	
En cours	x	$n_0 - x$		x	x	x	
Etat final	x_{max}	$n_0 - x_{max}$		x_{max}	x_{max}	x_{max}	

Puisque l'eau est en excès, alors le réactif limitant est **RCl** et l'avancement maximale est : $x_{\max} = \frac{n_0}{1} = 9,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

c- La conductivité de la solution change-t-elle ?

La réaction entraîne la formation d'ions $H^+_{(aq)}$ et $Cl^-_{(aq)}$ qui augmentent la conductivité du milieu réactionnel.

d- Trouver la relation entre la conductivité $\sigma(t)$ et l'avancement de la réaction $x(t)$.

La conductivité de la solution est exprimée par : $\sigma(t) = \lambda_{H^+} \cdot [H^+]_t + \lambda_{Cl^-} \cdot [Cl^-]_t$

D'après le tableau d'avancement, on a : $[H^+]_t = [Cl^-]_t = \frac{x(t)}{V}$

Puisque le volume de la solution est constant, alors : $\sigma(t) = (\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot \frac{x(t)}{V}$ (1)

À l'état final, on a : $\sigma(t_f) = \sigma_{\max} = (\lambda_{H^+} + \lambda_{Cl^-}) \cdot \frac{x_{\max}}{V}$ (2)


de (1) et (2) on déduit que : $\frac{(1)}{(2)} \quad \frac{\sigma(t)}{\sigma_{\max}} = \frac{x(t)}{x_{\max}}$

alors : $x(t) = x_{\max} \cdot \frac{\sigma(t)}{\sigma_{\max}}$ avec $x_{\max} = 9,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$ et $\sigma_{\max} = 1,955 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$

e- Calculer $x(t)$ à différents instants.

Voir ci-contre.

f- Tracer la courbe $x = f(t)$.



$t \text{ (s)}$	$x \text{ (mmol)}$
0	0
200	2,30
400	4,60
600	5,98
800	6,90
1000	7,82
1200	8,62
1400	8,73
1600	8,96
1800	9,20
2000	9,20

Résumé :

La mesure de la conductivité σ d'une solution ionique permet de suivre l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction x d'une manière continue pour les réactions dans lesquelles la différence entre la conductivité des produits et la conductivité des réactifs est importante.

III – Vitesse de réaction et le temps de demi-réaction :

1- Vitesse de réaction :

1-1- Définition :

La vitesse volumique d'une réaction correspond à la quantité de matière formée

ou disparue par unité de temps et de volume, tel que : $v(t_i) = \frac{1}{V} \left(\frac{dx}{dt} \right)_{t_i}$

avec V : le volume de la solution (m^3) et $\frac{dx}{dt}$: la variation de l'avancement x de la réaction par rapport au temps ($\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$).


L'unité de la vitesse volumique dans (SI) est : $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$

1-2- Détermination de la vitesse volumique de réaction :

Graphiquement : On trace la **tangente** à la courbe $x = f(t)$ à la date t choisie.

On calcule la valeur du rapport $\frac{dx}{dt}$ qui représente le **coefficient directeur** de cette **tangente**, et on le divise par la valeur de V (volume de la solution).


Utilisation d'un tableur : Il calcule directement la **vitesse v** à partir des valeurs de V , t_i et x_i .



1-3- Evolution de la vitesse de réaction au cours du temps :

On remarque la **diminution** de l'angle α et par conséquent les valeurs de **coefficient directeur** de la **tangente $\tan \alpha$** diminuent au fur et à mesure que la **transformation évolue** avec le temps.

Et puisque la **transformation** se déroule dans un **volume constant**, alors : **LA VITESSE DE RÉACTION DIMINUE AVEC LE TEMPS.**



2- Temps de demi-réaction :

2-1- Définition :

Le **temps de demi-réaction**, noté $t_{1/2}$, correspond au **temps nécessaire** pour que l'**avancement** soit parvenu à la **moitié** de sa **valeur finale** : $x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2}$.


Remarque : Si la **transformation** est **totale**, ce qui correspond à la **disparition** du **réactif limitant**, l'**avancement final** est égal l'**avancement maximal**, alors :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_{\max}}{2}$$

2-2- Détermination du temps de demi-réaction :

On le détermine **graphiquement** à partir de la **courbe des variations** de l'**avancement $x = f(t)$** :

- ⊕ On détermine la **valeur de l'avancement final x_f** par le traçage d'une **asymptote** à la **courbe**.
- ⊕ On détermine $\frac{x_f}{2}$ sur la **courbe**.
- ⊕ On détermine le **point d'intersection** de la **ligne horizontale** de l'ordonnée $\frac{x_f}{2}$ avec la **courbe**.
- ⊕ L'**abscisse** du **point d'intersection** représente le **temps de demi-réaction $t_{1/2}$** .



Remarque :

- ⚡ Pendant le **suivi temporel** de la **transformation**, la **durée** entre **chaque mesure** doit être **beaucoup plus courte** que le **temps de demi-réaction $t_{1/2}$** pour garantir l'**intégrité** de l'étude.
- ⚡ Le **temps de demi-réaction** permet d'estimer le **temps nécessaire** à la **fin** de la **transformation chimique étudiée** (environ $t_f = 10 t_{1/2}$).